

Qué pueden esperar los adultos después de recibir una vacuna



Algunas veces, las vacunas que lo protegen contra enfermedades graves también pueden provocarle molestias. Las vacunas provocan reacciones leves, pero las reacciones graves son muy raras. Las reacciones más comunes son enrojecimiento, fiebre, inflamación leve y dolor en el sitio de la inyección.

Fecha de hoy _____

Se le aplicaron las vacunas que se indican a continuación con una marca:

Influenza (“vacuna para la gripe”)	Virus del papiloma humano: 9vHPV
Tétanos/difteria Td	Meningocócica conjugada: MenACWY
Tétanos/difteria/tos ferina: Tdap	Meningocócica B: MenB
Antineumocócica de polisacáridos: PPSV23	Sarampión/paperas/rubéola: MMR
Neumocócica conjugada: PCV13	Varicela: Var
Vacuna recombinante para herpes zóster (Shingrix): RZV	Hepatitis A: HepA
Vacuna viva para herpes zóster (Zostavax): ZVL	Hepatitis B: HepB
Otra:	

Siga las indicaciones a continuación para aliviar las molestias de una vacuna reciente:

- Aplique una bolsa de hielo en gel o una compresa fría sobre el sitio de la inyección durante 5 a 10 minutos por vez.
- Utilice o ejercite el brazo en el que se le aplicó la vacuna. Esto ayudará a que se distribuya el medicamento rápidamente y aminore el malestar.
- Si tiene fiebre de más de _____, haga lo siguiente:
 - Tome un medicamento antipirético, según lo indique su proveedor de servicios de salud: _____
 - Tome muchos líquidos.
 - Use ropa ligera.

Si tiene alguna otra pregunta o está preocupado por sus síntomas, no dude en comunicarse con su proveedor de servicios de salud o con la clínica donde le aplicaron la(s) vacuna(s).

Número de teléfono: _____

Sus siguientes vacunas serán el día indicado a continuación o posteriormente: _____